

자주 질문하는

FAQ



대상포진은 재발할 수 있나요?

대상포진은 초기 발병 이후에도 재발할 수 있으며, 같은 사람에게서 반복적으로 발생할 수 있습니다.⁷

생백신 접종이력이 있어도 유전자재조합 백신(사백신) 접종이 가능한가요?

최소 8주 이후에 접종이 가능합니다.⁸

이전에 대상포진에 걸렸어도 유전자재조합 백신(사백신) 접종이 가능한가요?

급성기 회복 후 유전자재조합 백신(사백신) 접종을 권장하며, 구체적인 시기는 주치의와 상의하세요.⁴

염증성 장질환 치료중인데, 백신접종을 해도 될까요?

면역조절제 및 생물학제제/소분자약제 치료를 받고 있는 중에도 유전자재조합 백신(사백신) 접종을 권장합니다.⁶

**염증성 장질환 환자는 일반인구 대비
대상포진 발병 위험이 더 높습니다!**

대상포진 백신에 대해 의료진과 함께 상담하세요

대한장연구학회는 염증성 장질환 환자의
건강을 가장 소중하게 생각합니다

References | 1. Chen SY et al. Infection. 2014 Apr;42(2):325-334. 2. Harpaz R et al. Prevention of herpes zoster: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practice [ACIP]. MMWR Recomm Rep. 2008;57(RR-5):1-30. 3. Katz J et al. Surgical Clinics of North America. 1999;79:231-252. 4. 대한장연구학회. 건강정보. 염증성 장질환이란? [2023.08.04]. 5. Cullen G et al. Inflamm Bowel Dis. 2012;18:2392-2403. 6. 대한장연구학회. 성인예방접종 개정안. 대상포진 백신(2023). 7. Parikh R et al. Dermatol Ther (Heidelb). 2024 Mar;14(3):569-592. 8. CDC. Shingles (Herpes Zoster). Clinical Considerations for Shingrix Use in Immunocompromised Adults Aged ≥ 19 Years.

염증성
장질환

크론병

+

궤양성 대장염


환자라면

꼭

알아야 할

대상포진

「염증성 장질환 환자는
대상포진 발병률 약 **2배 높음**」



조기치료와 예방이 중요한
대상포진, 의사와 상담하세요

대상포진이란?

과거 수두를 앓았거나 예방접종을 통해 몸속에 들어온 수두-대상포진 바이러스가 신경절에 잠복해 있다가, 노화나 질병으로 인해 면역력이 저하되면 대상포진으로 재활성화되어 극심한 통증을 일으키는 질환입니다.²

미국 인구 기준

**성인 3명 중 1명,
평생 한 번은
대상포진 경험²**



극심한 고통의 대상포진



**염증성 장질환에
속하는
크론병,
궤양성 대장염⁴**

염증성 장질환 환자는 질환 및 치료 과정에서 면역력이 저하될 수 있으며, 대상포진 발생 위험이 증가할 수 있습니다.¹

염증성 장질환 환자가 대상포진에 걸렸을 때, 어떤 위험이 있을까요?



심한 급성 통증²



기저질환 악화⁵



대상포진 후 신경통²



치료 중단 위험⁵

면역조절제 또는 생물학제제/소분자약제 치료를 받고 있는 염증성 장질환(크론병, 궤양성 대장염) 환자에서 대상포진이 발생하게 될 경우 일시적 또는 영구적으로 치료를 중단하게 될 수 있습니다.⁵

대상포진 예방 시작은 백신으로!



면역조절제 또는 생물학제제/
소분자약제 치료를 받고 있다면?
유전자재조합 백신(사백신)접종을 권장합니다.⁶

* 면역조절제 또는 생물학제제/소분자약제 치료 중에는 생백신 접종이 불가합니다.⁶

대상포진, 예방이 중요합니다.

대상포진 백신에 대해
의료진과 함께 상담하세요